

リウマチ膝治療成績判定基準

術前・術後	病院名	記入者氏名	記入日
カルテ番号	患者氏名	手術名	
手術年月	性別	男・女	年齢 歳

項目	評価内容	点数		特記事項					
		右	左	右		左			
疼痛	全く無し	40	40	患者の具体的表現					
	動作時時々痛みあり	30	30						
	動作時常に痛みあり	20	20						
	疼痛のために動作できない	10	10						
	常に強い疼痛がある	0	0						
可動域	正座可能	12	12	実測角度					
	横座り・胡座可能	9	9				右	左	
	110°以上屈曲可能								
	75°以上屈曲可能	6	6						
	35°以上屈曲可能	3	3						
	強直・高度拘縮	0	0						
大腿四頭筋筋力	5	20	20	動揺					
	4・3	10	10						
	2以下	0	0						
平地歩行能力 (補助具なし)	不自由無し	20	20	装具	(時々)				
	やや困難	10	10		(常用)				
	困難～不可	0	0			一本杖	二本杖	車椅子	
階段昇降	不自由無し	8	8	10m歩行速度	秒				
	手摺を使い普通	6	6						
	一步一步	3	4		大腿周径	(5cm)			
	手摺を使い一步一步	2	2			(10cm)			
	できない	0	0		関節水腫	(右) -	±	+	++
合計			(左) -	±		+	++		

右側	左側
1) 医師の主観的評価 a. 点数 _____ (ばくぜんとした感じ. 通常成人を100点とする) 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100点	1) 医師の主観的評価 a. 点数 _____ (ばくぜんとした感じ. 通常成人を100点とする) 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100点
2) 患者の主観的評価 a. 点数 _____ (ばくぜんとした感じ. 通常成人を100点とする) 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100点	2) 患者の主観的評価 a. 点数 _____ (ばくぜんとした感じ. 通常成人を100点とする) 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100点