

脊髄損傷の神経学的および機能的国際評価法

運動		触覚		痛覚	
右	左	右	左	右	左
C2					
C3					
C4					
C5					
C6					
C7					
C8					
T1					
T2					
T3					
T4					
T5					
T6					
T7					
T8					
T9					
T10					
T11					
T12					
L1					
L2					
L3					
L4					
L5					
S1					
S2					
S3					
S4-5					

運動 標的筋群: 肘屈筋群, 手背屈筋群, 肘伸筋群, 指屈筋群(第3), 指外転(小指), 股屈筋群, 膝伸筋群, 足背屈筋群, 長趾伸筋群, 足底屈筋群
 触覚: 右, 左
 痛覚: 右, 左

総計 + = 運動スコア (最大) 50 50 ##
 総計 + = 疼痛スコア (最大:112)
 + = 触覚スコア (最大:112)

肛門随意的収縮 (可/不可)
 肛門感覚 (いずれか一方でも) (有/無)

0=完全麻痺
 1=収縮触知あるいは観察
 2=重力を除いての自動運動
 3=重力に抗しての自動運動
 4=抵抗に抗しての自動運動
 5=最大抵抗に抗しての自動運動
 NT=検査不能

0=脱出
 1=鈍麻
 2=正常
 NT=検査不能

神経学的レベル
 正常機能をもつ最も下位の髄節

	右	左
感覚	<input type="text"/>	<input type="text"/>
運動	<input type="text"/>	<input type="text"/>

完全麻痺/不完全麻痺

不全麻痺=
 最下位仙髄の
 感覚・運動機能の残存

部分的機能残存帯
 (完全麻痺の場合のみ)

神経支配の髄節部分

	右	左
感覚	<input type="text"/>	<input type="text"/>
運動	<input type="text"/>	<input type="text"/>